

FN/2006/PO/036

ALCOHOL GLICERINADO

1. NOMBRE: Alcohol glicerinado

2. SINÓNIMOS

3. COMPOSICIÓN

3.1. FÓRMULA PATRÓN

Glicerol	50 g
<i>Excipientes:</i>	
Solución hidroalcohólica 2	50 ml

3.2. MATERIAS PRIMAS

Componente

**Referencia
estándar**

Glicerol	RFE Mon. N° 0496
Solución hidroalcohólica 2	FN Mon. FN/2003/EX/027

3.3. MATERIAL Y EQUIPO

Ningún material específico distinto al previsto en los procedimientos que se indican.

4. METODOLOGÍA

PN de elaboración de soluciones (PN/L/FF/07/00).

MÉTODO ESPECÍFICO

Se mezcla el alcohol con el agua y a continuación se añade sobre el glicerol.

ENTORNO

No se requieren condiciones distintas a las especificadas en el PN de elaboración de soluciones.

5. ENVASADO Y CONSERVACIÓN

5.1. ENVASADO

Se envasa en frasco topacio.

5.2. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Se debe conservar a temperatura inferior a 30° C.

6. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO

Es un líquido transparente e incoloro.

7. PLAZO DE VALIDEZ

En condiciones óptimas de conservación el plazo de validez es de tres meses.

8. INDICACIONES Y POSOLOGÍA

Prevención de escaras de la piel y de grietas del pezón.

Posología:

Aplicar varias veces al día.

En madres lactantes se recomienda aplicar después de dar de mamar y lavar la zona antes de la siguiente toma.

9. REACCIONES ADVERSAS

En caso de piel no intacta, puede producir irritación.

10. PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

Contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

11. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

12. ETIQUETADO

La etiqueta debe confeccionarse siguiendo los criterios establecidos en el procedimiento general de etiquetado (PN/L/PG/008/00).

ALCOHOL GLICERINADO

Forma farmacéutica: solución cutánea.

Vía de administración: uso cutáneo, este medicamento debe aplicarse sobre la piel.

COMPOSICIÓN (100 g):

Glicerol	50 g
<i>Excipientes:</i>	
Solución hidroalcohólica 2	50 ml

ACTIVIDAD-INDICACIONES: prevención de escaras de la piel y de grietas del pezón.

CONTRAINDICACIONES: contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES: en caso de piel no intacta, puede producir irritación.

INTERACCIONES: hasta el momento no se han descrito las posibles interacciones de este medicamento.

POSOLOGÍA: aplicar varias veces al día.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: aplicar en la zona a tratar con la ayuda de un ligero masaje.

En madres lactantes se recomienda aplicar después de dar de mamar y lavar la zona antes de la siguiente toma.

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS: en caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS: hasta la fecha no se han descrito.

CONSERVACIÓN: se debe conservar a temperatura inferior a 30° C.

CADUCIDAD: no utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.